

صحة سرطان القولون والمستقيم

سرطان القولون والمستقيم قابل للشفاء إذا تم اكتشافه مبكراً

يُسجّل الأمريكيون السود أعلى معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في الولايات المتحدة. وهم أكثر عرضة للوفاة بسببه بنسبة 40%

يؤثر سرطان القولون والمستقيم على البالغين الأصغر سناً، مع ارتفاع معدلات الإصابة بنسبة 3% تقريباً سنوياً بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.

يُسجّل الأمريكيون الأصليون ثاني أعلى معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في الولايات المتحدة.

يُعد سرطان القولون والمستقيم من بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الأمريكيين الآسيويين.

عند اكتشاف المرض مبكراً، تكون معدلات البقاء على قيد الحياة متشابهة بين جميع المجموعات العرقية والإثنية



سرطان أكثر شيوعاً في الولايات المتحدة

خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مدى الحياة

1 من كل 23 رجل
1 من كل 25 سيدة

خيارات فحص سرطان المستقيم

الاختبارات المنزلية



- FIT (اختبار مناعي كيميائي للبراز أو اختبار الدم الخفي في البراز)، أو اختبار كولو غارد® (اختبار الحمض النووي للبراز متعدد الأهداف)، أو تصوير القولون المقطعي المحوسب.
- مناسب للبالغين ذوي المخاطر المتوسطة، وليس ذوي المخاطر العالية.
- لا يتطلب تحضيراً مسبقاً - اجمع عينة براز في المنزل. قد تتطلب النتائج إجراء تنظير للقولون.



تنظير القولون للمرضى

الفحص الوقائي الوحيد القادر على اكتشاف وإزالة الأورام الحميدة السابقة للسرطان خلال الفحص نفسه



- أفضل فحص لجميع البالغين - ذوي المخاطر المتوسطة والعالية.
- سيقوم الطبيب بفحص القولون باستخدام كاميرا صغيرة ومرنة.
- سيتم تخديرك لراحتك.
- استعد للإجراء بتغيير مؤقت في نظامك الغذائي، الصيام، واستخدام محلول تنظيف الأمعاء.

اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن الفحص المناسب لك

لا تكن مجرد رقم في الإحصائيات. اخضع للفحص.

كلما تم اكتشاف سرطان القولون أو المستقيم مبكراً، زادت فرص نجاح العلاج. تحدث إلى طبيبك اليوم لتحديد موعد الفحص المناسب لك.

